

























1	Við veingjum (ryggskjöldur á klukkum og líknandi verður eisini roknað sum veingir).	2	
-	Uttan veingir, ella í mesta lagið sera lítlar veingjalepar.	12	
2	Allir veingir tunnir.	3	
-	Í minsta lagið fremra parið hart ella leðurlíkt (sum t.d. ryggskjöldur á klukkum). Aftara parið er tunt ella manglar.	9	
3	Eitt par av veingjum (t.d. Diptera).	4	
-	Tvey pør av veingjum (t.d. hjá klukkum, har eitt par eru ryggskjöldur og eitt par er vanligu veingirnar sum liggja undir hesum).	5	
4	Sera lítil skordýr (5 mm), ein ella fleiri stuttar halar, antennur nógv longri enn høvdið.		Hemiptera:Coccoidea 
-	Framveingir vanligir. Ístaðin fyri afturveingir eru lítlar knappanáslíkar "halterer", hjá størri sløgum kunnu hesar vera fjaldar undir lepum á forveingjum. Antennur ofta stuttar og bustskapaðar.		Diptera, flugur 
5	Sera lítil skordýr við fjøðurlíkum veingjum, sum oftast verða hildnir tætt at kroppinum.		Thysanoptera 
-	Veingir lagdir við smáum flusi ella hárum.	6	
-	Veingir ikki lagdir við tættum flusi ella hárum, hóast æðrarnar kunnu vera lodnar, veingir oftast litleysir og klárir.	7	
6	Veingir lagdir við flusi, ofta sera litfagrir, ofta sæst ein samanullaður sevil.		Lepidoptera, firvaldar 
-	Veingir lodnir, oftast brúnir onkuntið svartir, í hvílu liggja teir sum eitt tak yvir kroppin, fáar tvøræðrar, antennur peika frameftir, afturveingir oftast breiðari enn framveingir, ikki samanullaðan sevil.		Trichoptera, várlugur 
7	Veingir við tøttum æðraneti og nógvum tvøræðrum.		Neuroptera: <i>Chrysopa carnea</i> 
-	Veingir við einans fáum tvøræðrum.	8	
8	Sera lítil skordýr, ofta við lodnum veingjaæðrum og møguliga nakað av flusi, æðramynstri sermerkt, veingir settir sum tak í hvílu, antennur lutfallsliga langar við minst 12 liðum.		Psocoptera 
-	Sera lítil ofta peruskapaði skordýr við súgvisevili, veingir oftast settir sum tak í hvílu, men flatar hjá nøkrum sløgum, antennur við í mesta lagið 10 liðum, ofta eru tvey røð omaná bakkroppinum.		Hemiptera:Aphidoidea, blaðlús 
-	Sera lítil til stór skordýr, afturveingir nógv minni enn framveingir, veingir oftast við stórum meskum, men hjá smærri sløgum kunnu æðrarnar vera nógv minkaðar (so meskarnir ikki síggjast), veingir ongantið sum eitt tak.		Hymenoptera 
9	Framveingir uttan æðrar, møtast mitt á uttan at leggjast útyvir hvønn annan.	10	
-	Framveingir við æðrum, leggjast antin útyvir hvønn annan ella eru settir sum tak.	11	
10	Framveingir stuttir, næstan fýrakantaðir, meginparturin av afturkroppinum sjónligur, kløður aftast á afturkroppinum.		Dermaptera: <i>Forficula auricularia</i> , tvísterter 
-	Framveingir sera harðir, liggja oftast (men ikki altíð) yvir allan afturkroppin, ongar kløður aftast á afturkroppinum		Coleoptera, klukkur 

11	Framveingir tunnir aftan, liggja flatir yvir afturkroppin í hvílu, ein tunnur súgvisevil sæst.	Hemiptera:Heteroptera, tekur	
-	Framveingir rættilega eins allastaðni, vanliga sæst ekki ígjøgnum teir (men tað kemur fyri), væl harðari enn afturveingirnar, sum tak í hvílu, ein klænur sevil sæst, hava lætt við at hoppa um tær verða órógvaðar.	Hemiptera:Auchenorrhyncha, Sprettur og Heteroptera:Psylloidea, Blaðloppur	
12	Við langum tunnum halum í afturendanum.		13
-	Mjá bleik dýr í moldini, fætunar hava ein lið,við tong í afturendanum.	Diplura: Japygidae	
-	Við stuttum halum ella als ongum hala.		14
13	Tveir halar, eingi eygu, lítil bleik djór í moldini.	Diplura	
-	Lítil, hoppandi skordýr við ongum veingjum, afturendin hevur	Collembola, hoppstertur	
-	Tríggir halar, gráflekkt skordýr, sum síggjast mest í fjøruni og hava lætt við at hoppa	Archaeognatha: <i>Petrobius maritimus</i>	
-	Tríggir halar, silvurskyggjandi slag, sum sæst inni í húsum	Zygentoma: <i>Lepisma saccharina</i> , silvurfiskur	
14	Mjá, bleik djór í moldini, eingi eygu, frambeinini ikki stórvaksin.	Diplura: Projapygidae	
-	Lítil, skordýr við ongum veingjum, afturendin hevur møguliga ein tvídeildan hala, sum kann liggja undir kroppin.	Collembola, hoppstertur	
-	Kroppurin við flusi ella fløtum hárum, farvegurin eftir veingjum sæst.	Honirnar nja onkrum sløgum av Lepidoptera, firvaldar	
-	Smælkar týðiliga fremst á afturkroppinum (týðiliga miðju), miðjan hevur ofta ein flusutan vøkstur, antennur við knekki á.	Hymenoptera:Formicidae, meyrur og nøkur sløg av Hymenoptera, vespur	
-	Fløt skordýr við lutfallsliga breiðum høvdi, antennur langar og klænar, afturlærið ofta stórt, ofta innandura í turrum matvørum og tílkum.	Psocoptera, bóklýs	
-	Lítil peruskapaði skordýr, høvdi nógv smalari enn kroppurin, ein sevil undir høvðinum, ofta eitt par av rørskapaðum vøkstrum á afturkroppinum, livur á grønum plantum.	Hemiptera:Aphidoidea, blaðlýs	
-	Sníkar á fuglum og súgdjórum.		15
15	Kroppurin samankleimdur frá síðuni, hoppandi oftast brún skordýr við langum bakbeinum.	Phthiraptera:Siphonaptera, loppur	
-	Kroppurin samankleimdur frá rygginum.		16
16	Høvdið fellur lutvíst inn í miðkroppin.		17
-	Høvdið fellur ikki inn í miðkroppin.		18
17	Antennur meir ella minni goymdar í lægdum, beinini nokkso stór, ofta við tveimum sterkum klóm.	Diptera: <i>Melophagus ovinus</i> , fœrilús og <i>Ornithomya chloropus</i> , ein fuglalús	
-	Antennur síggjast væl, bein klænri enn hjá flugum, klørnar ikki so týðiligar.	Hemiptera: <i>Cimex lectularius</i> , veggjalús	
18	Sera lítil avlang ella eggjaskapaði skordýr, høvdið næstan líka breitt sum kroppurin, frambringan skilist frá, fætur við einum ella tveimum klóm, bítandi munnpáttar.	Phthiraptera, lýs (skinn- og fjarðalýs)	
-	Sera lítil peruskapaði skordýr, høvdið nógv smalari enn kroppurin, bringupartarnir sum ein heild, fætur við einari stórari klógv, súgvandi munnpáttar.	Phthiraptera, lýs ("vanligar" lýs)	